

REVISTAS

Epilepsias en la práctica general

A SURVEY OF THE EPILEPSIES IN GENERAL PRACTICE. Research Committee of the College of General Practitioners. *Brit. M. J.* 5196: 416, 1960.

Un estudio estadístico realizado en Inglaterra y País de Gales pone de manifiesto los problemas más importantes que las epilepsias plantean al médico general. Encuentran que en la población estudiada el número de epilépticos alcanza el 4 ó 5 por mil, sin incluir los casos de crisis repetidas o aisladas que no se acompañan de alteraciones electroencefalográficas. De las formas clínicas, el Gran Mal aparece con más frecuencia en el sexo masculino aunque para otras formas esta preferencia según el sexo se invierte. La presentación de la enfermedad ocurre sobre todo entre los 15 y 24 años, si bien las primeras crisis son mucho más frecuentes en los dos primeros años de la vida. Alrededor de un 5 por ciento de las personas registradas habían tenido una crisis de corta duración a lo largo de su vida considerando que una de cada ocho de las personas de esta proporción desarrolló una epilepsia crónica y que una de cada ciento sesenta de las mismas fue completamente inhabilitada por la enfermedad. Un 8 por ciento de los epilépticos encontrados presentaba incapacidad social y laboral pero un 74 por ciento de los mismos realizaba vida normal. En el 42 por ciento de los casos las crisis estaban completamente contro-

ladas por el tratamiento, encontrando una proporción similar de enfermos con una sola crisis por año. Solamente un 3,5 por ciento de los casos recibía tratamiento hospitalario y en el 16 por ciento de los mismos aparecían problemas sociales de distinta índole. Desde el punto de vista farmacológico, el luminal era el fármaco más utilizado seguido de la difenilhidantoina y mesantoina.

Etiología de la cirrosis hepática

ZUR AETIOLOGIE DER LEBERCIRRHOSE. Riva, G. y D. M. Weiner. *Bull. schweiz. Akad. med. Wiss.* 16: 65, 1960.

Encuentran un 6,1 por ciento de cirrosis hepáticas en un total de 5482 autopsias. Después de excluir los casos de cirrosis biliar y de pigmentos, resulta un 4,1 por ciento de la llamada cirrosis portal. Clínicamente la cirrosis era la enfermedad fundamental en 1,5 por ciento de los casos, pero en un gran porcentaje, más de la mitad de las cirrosis de grado medio o ligero, la enfermedad era clínicamente inapreciable. El alcoholismo crónico desempeña un papel importante en la etiología, de 64,2 por ciento a 88,2 por ciento. Hepatitis es causa probable sólo en 5,4 por ciento a 7,4 por ciento de los casos.