

REVISTA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA



Vol. XXVII n.º 1
Marzo 1983

TEMA MONOGRAFICO

**QUIMIOTERAPIA
POR VIA ARTERIAL
DE LOS TUMORES
MALIGNOS**

Indicaciones:

Tratamiento y profilaxis de la enfermedad tromboembólica y de todos los procesos patológicos asociados con hiperactividad de las plaquetas.

Tratamiento y profilaxis de los trastornos vasculocerebrales isquémicos y de sus recidivas.

Tratamiento y profilaxis de las vasculopatías periféricas.

Prevención de las trombosis venosas profundas y de los accidentes trombóticos en el postoperatorio de la cirugía vascular periférica y de la cirugía traumatológica.

Situaciones de riesgo trombótico.

Complemento de la terapia anticoagulante en pacientes mal descoagulados.

Hipercoagulabilidad.

Composición:

300 mg de triflusal (DCI) por cápsula.

Posología:

1-3 cápsulas diarias, durante o al final de las comidas.

Dosis preventiva:

1 cápsula diaria o cada dos días.

Dosis de mantenimiento:

2 cápsulas diarias.

Dosis en situaciones de alto riesgo:

3 cápsulas diarias.

Presentaciones:

Disgren 50 cápsulas (P.V.P. 4.628,— pts.)

Disgren 30 cápsulas (P.V.P. 2.782,— pts.)

Disgren Envase Clínico 500 cápsulas.

Interacciones:

Potencia a los anticoagulantes, AAS y sulfonilureas. Asociado al dipiridamol se potencia la acción de ambos fármacos.

Contraindicaciones:

Deberá administrarse con precaución en la úlcera péptica y en pacientes con sensibilidad a los salicilatos.

No está demostrada su inocuidad en el embarazo.

Efectos secundarios:

En raros casos molestias gástricas que se evitan administrando el medicamento con las comidas y que ceden con antiácidos.


Intoxicación:

No se han descrito fenómenos tóxicos incluso a dosificaciones de 1.800 mg diarios. En caso de intoxicación accidental los síntomas son: excitación o depresión del SNC, alteraciones circulatorias y respiratorias y del equilibrio electrolítico, hemorragias digestivas y diarreas. Tratamiento con carbón activo, eliminación del fármaco (vómito, aspiración, lavado), prestando atención al equilibrio electrolítico e instaurando tratamiento sintomático.



J. URIACH & Cía., S.A.

El transcurrir
del tiempo
puede
interrumpirse...



Disgren

Triflusal

Antiagregante
plaquetario y
Antitrombótico
específico

INDICE

TEMA MONOGRAFICO

– Quimioterapia por vía arterial de los tumores malignos **9**

R. ESCO BARON

Introducción

Sistema nervioso central

Tracto aero-digestivo superior

Hígado

Pelvis

Extremidades

Localizaciones diversas

Complicaciones

Discusión

– Experiencia preliminar de quimioterapia intraarterial selectiva de tumores malignos localmente avanzados **21**

S. PARDO, J. M. GARBAYO, A. GIL, E. ALEGRIA, J. L. ZUBIETA, F. A. CALVO

Introducción

Material y métodos

Resultados

Discusión

Conclusiones

TERAPEUTICA PRACTICA

– Farmacología clínica de los hipolipemiantes **25**

R. CUENA BOY, J. R. AZANZA PEREA, J. HONORATO PEREZ

TRABAJOS DE INVESTIGACION

– Tratamiento de los derrames pleurales malignos **29**

G. VARELA, M. J. RUIZ, J. L. PUERTA

Se revisan los diversos tratamientos que se emplean para producir sínfisis pleural en pacientes con derrame pleural neoplásico recidivante, especialmente los que son más asequibles para cualquier centro hospitalario, por pocos medios técnicos de que disponga.

Se destacan el talco y el clorhidrato de tetraciclina intrapleural como los más eficaces, sencillos de utilizar y carentes de complicaciones y efectos secundarios importantes, y se describe la técnica que se sigue habitualmente para su utilización.

Fácil ventilación

Fluidasa

aumenta el VEMS
de forma rápida
y persistente



FLUIDASA SOLUCION

Frasco con 150 c.c. P.V.P. 516 ptas.

El frasco contiene: Mepifilina* 750 mg; Sorbitol 40 g; Sacarina sódica 30 mg.

Posología

Niños menores de 5 años: de 1 a 2 cucharaditas (de 5 c.c.) 3 ó 4 veces al día.

Niños mayores de 5 años: de 2 a 3 cucharaditas (de 5 c.c.) 3 ó 4 veces al día.

Adultos: En los casos graves, Fluidasa inyectable. Como terapia de mantenimiento, dosis de 3 cucharadas (de 15 c.c.), al día, suelen ser suficientes.

FLUIDASA CAPSULAS

Envase con 20 cápsulas. P.V.P. 1577 ptas. Cada cápsula contiene 150 miligramos de Mepifilina.*

Posología: *Adultos:* de 1 a 2 cápsulas cada 8 horas, es decir, de 3 a 6 cápsulas en las 24 horas.

En *niños* debe ser utilizada la forma farmacéutica de solución oral o gotas.

Indicaciones: Bronquitis agudas y crónicas, especialmente las que presentan gran componente espástico.

Contraindicaciones: El medicamento no debe ser utilizado durante el embarazo, especialmente durante el primer trimestre.

Incompatibilidades: Como con cualquier otro producto, es recomendable administrarlo, sin mezclarlo, en el momento de la toma, con ninguna otra sustancia. De esta forma se evitarán posibles reacciones insospechadas que pueden producir inactivación terapéutica e intolerancia.

Puede potenciar la acción depresora central de antihistamínicos, sedantes, o hipnóticos.

Efectos secundarios: A las dosis terapéuticas no se han descrito.

Precauciones: Los pacientes tratados con Mepifilina, deberán abstenerse de conducir o manejar maquinaria peligrosa, hasta comprobar que no se produce somnolencia como efecto secundario.

* Mepifilina, síntesis de Laboratorios Made. Patente Internacional.



LABORATORIOS MADE
Avenida de Burgos, 91. Madrid-34

— **La predicción en psiquiatría** 32

J. MUÑOZ RUATA

En este trabajo se estudian y comparan dos formas fundamentales de predicción: la predicción estadística y la predicción clínica. En general, se comprueba la mayor validez de la predicción estadística, al menos en apariencia, según los resultados de los trabajos revisados. Aparte de desmentir ideas preconcebidas, la exposición puede servir para abordar un estudio más profundo del tema.

— **Derivación interna en el tratamiento de las hidatidosis hepáticas** 37

F. VICENTE, I. GOENA, J. VOLTAS, J. M. LERA, G. ZORNOZA, J. L. CLEMENTE, A. FAKIH

Se presentan los resultados obtenidos al aplicar la técnica de quisto-yeyunostomía en el tratamiento de la hidatidosis hepática humana.

Se exponen las condiciones necesarias para aplicar esta técnica y se efectúa un estudio de la morbi-mortalidad de la intervención concluyéndose que este método quirúrgico sigue siendo válido cuando la intervención está indicada.

— **Tratamiento y profilaxis de las metástasis ganglionares de los carcinomas de cavidad oral** 39

A. ARELLANO, P. ARAMBURO, A. DE LA TORRE, A. SACHETTI, F. CALVO, G. ARAGON, J. OTERO

Estudio de 242 pacientes portadores de un carcinoma de cavidad oral tratados, desde 1964 a 1977, en el Servicio de Radioterapia de la Clínica Puerta de Hierro de Madrid.

Se trataron 26 T₁, 96 T₂ y 120 T₃, con una supervivencia actuarial a los cinco años del 52,5 %.

NUEVOS MEDICAMENTOS

— **Moxalactam** 45

R. CUENA BOY, J. R. AZANZA PEREA, J. HONORATO PEREZ

NOTICIAS DE LA CLINICA UNIVERSITARIA

— **El departamento de enfermería en la Clínica Universitaria de Navarra** 47

M. A. SANCHEZ

MEDICINA Y PERSONA

— **Los límites éticos de la Investigación Científica** 51

G. HERRANZ

NOTICIAS DE LA FACULTAD

— **Convocatoria de residentes para 1984** 56

CRITICA DE LIBROS 57

REVISTA DE MEDICINA

DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

VOL. XXVII - N.º 1
March 1983

Contents

MONOGRAPHY

Intraarterial chemotherapy of malignant neoplasms

R. Escó Barón
9

Selective intraarterial chemotherapy of locally advanced malignancies. A preliminary experience

S. Pardo, J. M. Garbayo, A. Gil, E. Alegría, J. L. Zubieta,
F. A. Calvo
21

PRACTICAL THERAPY

Clinical pharmacology of antilipemic drugs

R. Cuenca Boy, J. R. Azanza Perea, J. Honorato Pérez
25

ORIGINAL ARTICLES

The treatment of malignant pleural effusions

G. Varela, M. J. Ruiz, J. L. Puerta
29

Prediction in psychiatry

J. Muñoz Ruata
32

Internal derivations in the surgical treatment of hepatic hydatidosis

F. Vicente, I. Goena, J. Voltas, J. M. Lera, G. Zornoza,
J. L. Clemente, A. Fakh
37

Prevention and treatment of ganglionic metastasis of oral carcinoma

A. Arellano, P. Aramburu, A. de la Torre, A. Sachetti,
F. Calvo, G. Aragón, J. Otero
39

NEW DRUGS

Moxalactam

R. Cuenca Boy, J. R. Azanza Perea, J. Honorato Pérez
45

UNIVERSITY CLINIC NEWS

The nursing department in the University Clinic of Navarre

M. A. Sánchez
47

MEDICINE AND PERSON

The ethical limitations of scientific investigation

G. Herranz
51

FACULTY NEWS

Convocation of Residents for 1984

56

BOOK REVIEW

57