

Traitemen^t des abcés amibiens du foie par aspiration discontinue et injections medica menteuses in situ

H. M. L. Sobier et R. Marcaulèry ()*

(Publicado in extenso en Rev. Int. d'Hépatologie 9: 575, 1959)

RESUMEN

La hepatectomía no es el único tratamiento de los abcesos amebianos del hígado. La punción hepática, que conduce en último término al diagnóstico de la hepatitis amebiana supurativa, puede utilizarse igualmente como método terapéutico. Razonando su indicación y realizándola con técnica rigurosa, no entraña peligro alguno. En cambio permite el lavado y la evacuación de la cavidad del abceso, introducir sustancias que facilitan la liquefacción del pus, inyectar medicamentos (antibióticos, emetina) y sustancias opacas de rápida reabsorción para el control radiográfico. Cuando la evolución clínica y radiológica obligue a repetir la punción más de 4 o 5 veces, es aconsejable colocar un tubo de plástico que permite proseguir el tratamiento.

SUMMARY

Treatment of Liver Amebic Abscesses by repeated aspiration and introduction of drugs in situ

Hepatectomy should not be considered as the sole treatment of amebic abscesses, and its indications may be discussed to the benefit of other methods. The puncture of the liver, classically considered as being the last diagnostical step in amebic suppurative hepatitis, may equally be employed as a means of treatment for this lesions. If correctly carried out, for rational indications and with an accurate technique, the puncture of the liver is not a dangerous practice. Repeated punctures may be

performed with therapeutic aims in view: evacuation and washing-out of the cavity, introduction of substances to help the liquefaction of the pus and of rapidly resorbed medicinal substances for radiographic control.

To allow the continuance of treatment and according to the radiological and clinical evolution of the abcess, repeated punctures (4 or 5) must be replaced by installing a set of plastic tubes.

(*) Dakar.