

Análisis comparativo de pacientes con lesiones estenóticas y ectásicas coronarias

M. Aparici* / C.A. Fernández* / J. Barba* / E. Alegría*

RESUMEN

Se estudian 177 pacientes con lesiones coronarias, 69 de éstos con lesiones ectásicas, bien aisladas (n = 18) o bien asociadas con estenosis (n = 51) y 108 con sólo lesiones estenóticas.

Analizando las distintas variables clínicas y epidemiológicas, se encuentran diferencias significativas en la mayor prevalencia de hipertensión en el grupo con ectasias. Se observa también una mayor proporción de infarto agudo de miocardio en el grupo con ectasias asociadas a estenosis. También se observa una mayor mortalidad global en el grupo con ectasias asociadas a estenosis, tratados tanto médica como quirúrgicamente.

Introducción

Desde que Morgagni¹ utilizó el término ectasia para definir las dilataciones localizadas o difusas de las arterias coronarias, no han sido muchos los que han estudiado esta entidad. Sherkat et al en 1967² describieron angiográficamente las dilataciones ectásicas, que hasta entonces eran sólo hallazgos de estudios necróscopicos.

Se han implicado muchos factores etiológicos relacionados con la ectasia coronaria. En la tabla I se ofrece una visión de ellos. De estos agentes hay que destacar uno, la aterosclerosis³, la cual ha sido siempre relacionada sólo con la estenosis. A la vista de varias observaciones de distintos autores, cabe pensar que la aterosclerosis, se podría presentarse en unos pacientes como estenosis, en otros como ectasias y en otros se presentan de forma combinada. En la patogenia de aterosclerosis hay una serie de factores de riesgo relacionados con ésta. Intentamos establecer si existe un determinado perfil epidemiológico, así como diferencias clínicas en relación con la distinta morfología coronaria.

Material y métodos

Con el objeto de establecer si existían diferencias en el perfil epidemiológico y clínico entre pacientes con distinta morfología coronaria, estenosis o dilatación ectásica, se revisaron 3.693 estudios angiográficos realizados en nuestro Centro por sospecha de cardiopatía isquémica.

Todos los pacientes fueron coronariografiados mediante la técnica de Judkins, practicándose 5 proyecciones. Se definió como ectasia o aneurisma coronario, cuando algún segmento de la arteria coronaria era de una vez y media el calibre de una zona normal. Utilizamos para la clasi-

Tabla I. ETIOLOGIA DE LA ECTASIA CORONARIA

Aterosclerosis ³
Poliarteritis nodosa ⁴
Enfermedad de Kawasaki ⁵
Embolia micótica ⁶
Enfermedad de Takayasu ⁷
Sífilis ⁸
Endocarditis ⁹
Fiebre reumática ¹⁰
Síndrome de Marfan ¹¹
Enfermedad de Ehlers-Danlos ¹²
Metástasis tumorales ¹³
Traumatismo torácico ¹⁴
Cardiopatía congénita cianótica ¹⁵
Aneurisma de ventrículo izquierdo ¹⁵
Estenosis supraavalvular aórtica ¹⁵
Medionecrosis quística ¹⁶
Congénita ¹⁷

ficación morfológica de las ectasias la propuesta por Ducceschi et al¹⁰: tipo I fusiformes; tipo II saculares; tipo III esféricas; tipo IV difusas y tipo V mixtas. Se definió enfermedad estenótica significativa, cuando el calibre interno de las tres coronarias principales se veía reducido en un 70 % o una reducción del 50 % del tronco principal de la coronaria izquierda. Los estudios coronariográficos fueron exami-

* Dpto. de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona.

nados por dos observadores, consultando a un tercero cuando existían discrepancias.

Con relación a la historia clínica se prestó atención especial a los antecedentes de hipertensión arterial, tabaquismo, hipercolesterolemia, diabetes, stress y antecedentes familiares de cardiopatía isquémica, así como el despistaje de causas menos frecuentes de ectasia.

La clínica presentada por los pacientes fue dividida en cuatro grupos: a) pacientes que tuvieron solo infarto; b) pacientes que sólo presentaron angina; c) en éste se incluyeron aquéllos que presentaron angina y luego infarto y en el d) se incluyeron a los que tuvieron infarto y posteriormente angina.

También se prestó atención al tratamiento recibido médico o quirúrgico y a la evolución que siguieron estos pacientes.

Todos los datos fueron procesados por ordenador, se utilizó el test de χ^2 para las variables cualitativas y para las cuantitativas la t de student.

Resultados

De los 3.693 estudios coronariográficos, objetivamos en 69 pacientes (1,86 %) dilataciones coronarias asociadas o no a estenosis. De estos, cincuenta y uno presentaban estenosis asociadas y 18 presentaban las dilataciones o ectasias como única lesión. Con el fin de poder establecer comparaciones con pacientes con sólo lesiones estenóticas, elegimos un grupo de 108 pacientes (que previamente habíamos utilizado como control para otro estudio y que pertenecía también a esa muestra de 3.693 pacientes) cuyo único requisito era presentar alguna lesión estenótica significativa. De tal modo que el número total de pacientes estudiados fue 177 configurados en dos grupos: grupo A (n=69) pacientes con ectasias, dentro de éste establecidas en dos subgrupos A1 (n=51), 74 % pacientes con lesiones ectásicas y estenóticas asociadas y A2 (n=18) 26 % pacientes con sólo ecta-

sias. El grupo B (n=108) pacientes con sólo lesiones estenóticas significativas. En la tabla II se pueden ver los principales datos de éstos.

Coronariografía

Los resultados de la coronariografía del grupo A (n=69) revelaron la existencia de 96 ectasias y 82 estenosis. La distribución de las ectasias fue la siguiente. En 18 ocasiones se presentaron de forma aislada mientras que en 78 se asociaron a estenosis. En 48 pacientes se presentó una sola ectasia por paciente, mientras que en 21 se presentó más de una ectasia por paciente. En la tabla III se pueden observar los datos pormenorizados de la localización de las ectasias. La localización más frecuente fue la coronaria derecha, le siguió la descendente anterior y por último la circunfleja (Fig. 1).

En relación con el tipo morfológico, el más frecuente fue el tipo IV o difuso que se presentó en 78 ocasiones, fue seguido por el tipo II o sacular en 10 ocasiones y por último el tipo I o fusiforme se presentó 8 veces. Haciendo relación al tipo y la arteria más frecuentemente afectada, lo fue la coronaria derecha que en 46 ocasiones presentó una ectasia difusa. En la figura 2 se puede ver la relación entre el tipo morfológico y la arteria afecta.

Analizando la prevalencia de estenosis en los dos grupos en los que se presentaban, A1 y B, observamos 169 estenosis en el grupo B y 82 en el grupo A1. En la figura 3 se puede

Tabla II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION UTILIZADA

Grupo	N.º sujetos	Edad media	Sexo	
			Varones	Hembras
A	69	57,83 ± 8,4	69	0
A1	51	58,43 ± 8,4	51	0
A2	18	56,50 ± 9,6	18	0
B	108	51,50 ± 7,5	101	7

Tabla III. LOCALIZACION DE LAS ECTASIAS

Localización	N.º pacientes (n=69)
Única	
DA	12
CD	6
Cx	30
Múltiples	
DA + Cx	2
DA + CD	13
CD + Cx	0
Cx + DA + CD	6

Abreviaturas: Cx = Coronaria circunfleja; CD = Coronaria derecha; DA = Coronaria descendente anterior.




Fig. 1.—Localización de las ectasias. Abreviaturas: CD = Coronaria derecha; Cx = Coronaria circunfleja; DA = Descendente anterior.




Fig. 2.—Relación entre el tipo morfológico de ectasia y la arteria afectada. Abreviaturas: CD= Coronaria derecha; Cx= Coronaria circunfleja; DA= Descendente anterior.




Fig. 3.—Estenosis coronarias en los grupos B y A1. CD= Coronaria derecha; Cx= Coronaria circunfleja; DA= Descendente anterior.

Tabla IV. CLINICA QUE PRESENTABAN LOS DISTINTOS PACIENTES

Clínica	Grupo					
	A		A1		B	
	n	%	(A1)	(A2)	n	%
Sólo angina	28	40	13	15	* 63	58
Sólo infarto	14	20	13	1	36	33
Angina + IAM	13	18	13	1	** 2	0,9
IAM + Angina	14	20	12	1	** 7	6,4
Total	69	98	51	18	108	

* p<0,05; ** p<0,01

observar el número de estenosis y su localización.

Clínica

La clínica presentada fue dividida por cuatro categorías: a) pacientes que sólo presentaron angina; b) pacientes que sólo tuvieron un infarto agudo de miocardio (IAM); c) en ésta se incluyeron aquéllos que debutaron con angina y posteriormente presentaron un IAM y d) aquéllos que presentaron un IAM y luego presentaron angina. En la tabla IV se pueden observar los pacientes que estaban en cada categoría. Se apreciaron diferencias significativas en la mayor prevalencia de presentación de angina aislada en el grupo B (pacientes con sólo lesiones estenóticas) y en la mayor prevalencia de presentación de angina y posteriormente infarto, así como de infarto y luego angina en el grupo A (pacientes con ectasias asociadas o no a estenosis).

Analizando el total de los pacientes que habían presentado angina (asociada o no a infarto) y aquellos que presentaron infarto asociado o no a angina, resultó que un 81 % (n = 55) del grupo A y un 66 % (n = 72) en el grupo B presentaron angina. Con respecto al infarto, la prevalencia fue del 59 % (n=41) y un 41 % (n=45) en los grupos A y B respectivamente. Se observaron diferencias significativas en la mayor presentación de angina (p=0,05) y de infarto (p<0,05) en el grupo A.

Factores de riesgo

Analizando los factores de riesgo de forma global, observamos que el que presentó su mayor frecuencia de aparición fue el tabaco en un 70 % seguido de hipertensión, hipercolesterolemia y diabetes en un 38, 31 y 10 % respectivamente. Se presentaron con mucha menos frecuencia antecedentes familiares de cardiopatía isquémica y stress, 4 y 1 % respectivamente.

Analizando los factores de riesgo en los grupos A y B (y también de los subgrupos A1 y A2), los cuales se pueden ver en las tablas (V, VI y VII) se encontró un perfil de presentación similar aunque existieron una serie de diferencias significativas en cuanto a la presentación de los mismos. Se en-

Tabla V. PREVALENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO EN LOS GRUPOS A Y B

	A		B	
	n	%	n	%
Tabaco	48	69	76	70
HTA	35	50	* 33	30
Hipercolesterolemia	22	31	33	30
Diabetes	13	18	* 5	4,6
Familiares	1	1,4	** 7	6,5
Stress	1	1,4	1	0,6

Abreviaturas: HTA = Hipertensión.
* p<0,01; ** p<0,05

Tabla VI. PREVALENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO ENTRE A1 Y B

	A1		B	
	n	%	n	%
Tabaco	35	71	76	70
HTA	25	48	* 33	30
Hipercolesterolemia	18	34	33	30
Diabetes	10	19,2	* 5	4,6
Familiares	1	1,9	7	4,6
Stress	1	1,9	* 1	0,9

Abreviaturas: HTA = Hipertensión.
* p<0,01; ** p<0,05

Tabla VII. PREVALENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO ENTRE A2 Y B

	A2		B	
	n	%	n	%
Tabaco	11	61	76	70
HTA	10	55	* 33	30
Hipercolesterolemia	4	22	33	30
Diabetes	3	16,6	5	4,6
Familiares	0	0	* 7	6,5
Stress	0	0	1	6,9

Abreviaturas: HTA = Hipertensión.
* p<0,01; ** p<0,05

contraron diferencias significativas estadísticas en la mayor frecuencia de hipertensión en los pacientes del grupo A2 (55 %) y A1 (48 %) frente a los del grupo B (30 %), p<0,05 en ambos casos. Se encontraron también diferencias en cuanto a la presencia de antecedentes familiares entre los grupos A2 y B (0 y 6,5 %) respectivamente, p<0,05 y también en cuanto a la presentación de diabetes, A1 (19,23 %) y B (4,6 %) p<0,05.

Tratamiento y evolución

En relación al tratamiento practicado en los distintos grupos hay que decir que los pacientes con sólo ectasias fueron tratados 17 con tratamiento médico y sólo uno mediante injerto aorto-coronario. En el grupo con estenosis asociada a ectenosis, en 36 pacientes se efectuaron 65 injertos aorto-coronarios y el resto se trató mediante medicación. En aquellos pacientes con sólo estenosis fueron 62 los pacientes sometidos a cirugía, con 103 injertos practicados, siendo el resto tratados médicamente.

La evolución al año en los pacientes con sólo ectasias fue favorable, sólo uno de los pacientes tratado con medicación, continuó con molestias atípicas precordiales. En aquellos con estenosis asociada a ectasia, de los intervenidos 33 permanecían asintomáticos, 2 continuaron con angina y uno falleció en el postoperatorio inmediato. De los 15 tratados médicamente, cuatro continuaron con molestias anginosas y no falleció.

En los que presentaban estenosis como lesión única de los tratados quirúrgicamente, cinco continuaron con angina y uno falleció en el postoperatorio. Los que fueron tratados médicamente cuatro continuaron con angina y uno falleció, no pudiendo filiarse la causa por no tener autopsia.

Discusión

La prevalencia de las lesiones ateroscleróticas, estenosis y ectasias, coronarias no es bien conocida durante la vida. Si es más conocida la incidencia de lesiones coronarias en estudios necrópsicos. Obviamente la ectasia, que es menos conocida, en estudios post-mortem, fue en la serie de Daoud et al⁸ de 1,4 %. Esta prevalen-

Tabla VIII. FRECUENCIA DE ECTASIAS EN VARIAS SERIES

Serie	N.º casos	N.º ectasias	%
CASS ¹⁹	20.087	978	4,9
Pooled data ²²	8.759	148	1,65
Hartnell et al ²³	4.993	70	1,4
Aparici et al ²¹	3.693	69	1,86

cia varía mucho en estudios angiográficos hechos en pacientes con cardiopatía isquémica, oscilando entre 1,2 %⁸ y 4,9 %¹⁹. En nuestra serie la aterosclerosis fue la causa principal de las lesiones tanto estenóticas como ectásicas, coincidiendo con la mayoría de las series publicadas.

Usualmente las ectasias van asociadas con estenosis, muestra de ello es que tanto en otras series^{15, 20} como en la nuestra, fue un evento notable. Así, en nuestra serie esto ocurrió en un 74 %²¹. Esto parece lógico, dado que parecen ser manifestaciones morfológicas distintas de una misma entidad patológica⁶.

Lo que ya no está tan claro es porque en unas determinadas situaciones se presentan ectasias, en otras lesiones estenóticas y en otras ambas asociadas. Quizás puede que estas variaciones en la presentación de una determinada morfología estén en relación con los tantas veces aludidos factores de riesgo. Así en nuestra serie hubo una serie de factores de riesgo que tuvieron distinta prevalencia, presentando diferencia significativa estadística. Así, la hipertensión presentó una mayor prevalencia en el grupo con lesiones ectásicas. Esta mayor prevalencia se mantenía subdividiendo al grupo en aquellos que tenían asociados estenosis o presentaban las ectasias como única lesión. Quizás a este nivel de asociación epidemiológica se necesitan estudios con un mayor número de pacientes, dado que hasta ahora no existen demasiados estudios como éste.

También es cierto que no existen demasiados estudios analizando el perfil clínico en relación con la anatomía coronaria y menos con relación a la ectasia coronaria. En la tabla VIII se pueden observar las series más numerosas sobre ectasias publicadas.

Se ha descrito también que los pacientes que presentan lesiones ectásicas y estenosis presentan una mayor prevalencia de infartos agudos de miocardio⁶. En nuestra serie así ocurrió, se presentaron más infartos en aquellos pacientes del grupo A, a expensas de los del subgrupo A1 (pacientes con ectasias y estenosis). Asimismo hubo una incidencia mayor de angina en el grupo A1 a expensas esta vez del grupo A2 (sólo ectasias). Quiere esto decir que la asociación de lesiones produce más patología. No es del todo desacertado el pensar que aquellos pacientes que presenten ambos tipos de lesiones, tengan las complicaciones de estas dos. Obvia-

mente si a una disminución de calibre (estenosis) que de por sí produce entecimiento de la circulación, se le añade una dilatación pre o postestenótica, el flujo además de ser más lento, es mucho más turbulento, con muchas más posibilidades de génesis de trombos intracoronarios con ulterior embolización y consecuencias derivadas de esto.

La mortalidad en nuestra serie de forma global con un año de seguimiento fue de 2,89 %. Desglosando ésta se advierte que en los pacientes con sólo ectasias no falleció ningún paciente. En el grupo con lesiones asociadas la mortalidad fue de 2,89 %. Si pormenorizamos en los tratados médica o quirúrgicamente nos encontramos con unas mortalidades de 6,6 y 2,7 % respectivamente. A este respecto, Hartnell et al²³ señala una mortalidad de 4,6 % en el grupo tratado médicamente y 2,4 % en aquellos que fueron tratados mediante cirugía. En el grupo con lesiones estenóticas, la mortalidad fue de 1,85 % de forma global, repartiéndose en 1,6 y 2,17 % respectivamente para los tratados quirúrgicamente y médicamente. También a este respecto suelen ser más malignas la asociación de estenosis y ectasia. Otros estudios señalan que no existen diferencias en relación a la revascularización en pacientes con o sin ectasias²⁰.

Creemos que se deben realizar más estudios comparativos prospectivos en pacientes con distintos tipos de lesiones morfológicas coronarias, para establecer bien las diferencias clínicas, así como para obtener mejores pautas de tratamiento.

Bibliografía

- Morgagni JB. *De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis. Tomus primus liber 11. Epist, 27, Articles 28, Venetiis 1761.*

(Robinson, F.C. Aneurisms of coronary arteries. *Am Heart J* 109: 129, 1985).

- Sherkat A, Kavanagh-Gray D y Edworthy J. *Localized aneurysms of the coronary artery.* *Radiology* 89: 24, 1967.
- Oliveros RA, Falsetti HL, Carrol RJ, Heinle RA y Ryan GF. *Atherosclerotic coronary artery aneurysm. Report of five cases and review of literature.* *Arch Intern Med* 134: 1.072, 1974.
- Holsinger DR, Osmurson PJ y Edwards JE. *The heart in periarteritis nodosa.* *Circulation* 25: 616, 1962.
- Kawasaki T. *Clinical features of Kawasaki syndrome.* *Acta Paediatr* 25: 79, 1983.
- Swanton RM, Thomas ML, Coctart DJ, Jenkins BJ, Webb Peplow MM y Williams BT. *Coronary artery ectasia. A variant of occlusive coronary arteriosclerosis.* *Br Heart J* 40: 393, 1978.
- Kitamura S, Kawashima Y, Miyamoto K et al. *Multiple coronary artery aneurysm resulting in myocardial infarction in a young man.* *J Thorac Cardiovasc Surg* 70: 290, 1975.
- Daoud AJ, Pankin D, Tulgan H y Florentin RA. *Aneurysms of the coronary artery: Report of ten cases and review of literature.* *Am J Cardiol* 11: 228, 1963.
- Packard M y Wechsler MF. *Aneurysms of the coronary arteries.* *Arch Intern Med* 43: 17, 1929.
- Ducceschi R, Huck W, De Morales CF et al. *Aneurisma das arterias coronarias.* *Arq Bras Cardiol* 47: 317, 1986.
- McKoeown F. *Dissecting aneurysm of the coronary artery in arachnoidactily.* *Br Heart J* 22: 434, 1960.
- Shiro, Imahori, Bannerman RM, Graft CJ y Brennan JC. *Ehlers-Danlos syndrome with multiple arterial lesions.* *Am J Med* 47: 967, 1969.
- Crocker DW, Sobin S y Thomas WC. *Aneurysm of coronary arteries: Report of three cases in infants and review of the literature.* *Am J Pathol* 33: 819, 1957.
- Loring WE. *Multiple arteriosclerotic aneurysms of coronary arteries.* *Arch Pathol* 59: 479, 1955.
- Befeler B, Aranda JM, Embi A, Mullin F, El-Sherif N y Lazzaro R. *Coronary artery aneurysm. Study of their etiology, clinical course and effect on left ventricular function and prognosis.* *Am J Med* 62: 597, 1977.
- Rath S, Har-Zahau Y, Battler A et al. *Rate of nonobstructive aneurysmatic coronary ar-*

tery disease: *Angiographic and clinical follow-up report*. Am Heart J 109: 785, 1985.

17. Alegría E, Arós F, Malpartida F, Tellez J y Martínez Caro D. *Patología coronaria congénita en adultos. A propósito de dos casos de aneurisma coronaria*. Rev Med Univ Navarra 22: 226, 1978.

18. Markis JE, Joffe CD, Cohn PF, Feen DJ, Herman MU y Gorlin R. *Clinical significance of coronary arterial ectasia*. Am J Cardiol 37: 217-222, 1976.

19. Swaye PS, Fischer LD, Litwin P, Vignola PA, Judkins MP, Kemp HG, Mudd JG y Grosselin AJ. *Aneurysmal coronary artery disease*. Circulation 67: 134, 1983.

20. Aintablian A, Hamby RI, Hoffman I y Kramer RJ. *Coronary ectasia: Incidence and results of coronary bypass surgery*. Am Heart J 96: 308, 1978.

21. Aparici M, Peteiro J, Hidalgo R, Fernández de Almeida CA, Alzamora R, Barba J

y Alegría E. *Coronary artery ectasia: another form of atherosclerosis*. Med Clin (Barc) 93: 368-371, 1989.

22. Falsetti HL y Carroll RJ. *Coronary artery aneurysms. A review of the literature with a report of 11 new cases*. Chest 69: 630, 1976.

23. Hartnell CG, Parnell BM y Pridie RB. *Coronary artery ectasia. Its prevalence and clinical significance in 4.993 patients*. Br Heart J 54: 392, 1985.

Summary

A total number of 177 patients with coronary lesions were studied. Sixty nine of them presented either a combination of stenotic and ectatic lesions (n=18) or isolated ectatic lesions (n=51) and 108 presented only stenotic lesions.

Analyzing several clinical and epidemiological parameters we observed a significant difference with respect to the higher prevalence of hypertension among the group affected by ectatic lesions. We verified as well a higher prevalence of myocardial infarction in the group of ectasia associated to the stenotic lesions. Finally, a higher global mortality was observed in the group of ectasia associated to stenotic lesions after medical or surgical treatment.

NUTRICION

ASPECTOS BIOQUIMICOS, METABOLICOS Y CLINICOS

EDITOR:
MARIA C. LINDER

PROLOGO:
HAMISH N. MUNRO

VERSION EN CASTELLANO Y ADAPTACION:
SANTIAGO SANTIDRIAN ALEGRE

NOVEDAD

Número de páginas: 512
Formato: 22 x 28 cm.
P.V.P.: 5.950 Ptas. (IVA incluido)

EDICIONES UNIVERSIDAD DE NAVARRA, S. A.
Apdo. 396 - 31080 PAMPLONA

EUNSA