

REVISTA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA


Vol. XXXIV • N.º 3 • Julio-Septiembre 1990



Cri[↑]no[↓]ren 20mg

Maleato de enalapril

*El primer inhibidor específico del E.C.A.
de acción prolongada y de dosis única diaria.*



INDICE

TRABAJOS DE INVESTIGACION

- **Lavado broncoalveolar en pacientes intervenidos de cirugía cardíaca extracorpórea** 131
C. ABAD
A 19 pacientes operados de cirugía cardíaca con circulación extracorpórea (CEC) se les realizó un lavado broncoalveolar (LBA) momentos antes (1.º LBA) y después (2.º LBA) de la CEC. Comparando los resultados del recuento celular del 1.º LBA con el 2.º LBA se ha visto en este último un mayor número de neutrófilos, hecho indicativo de una posible agresión sobre el pulmón inducida por la CEC.
-

CASOS CLINICOS

- **Adenocarcinoma ceruminoso: a propósito de un caso** 135
E. URBIOLA MARCILLA
Se presenta un caso de adenocarcinoma ceruminoso ("ceruminoma") localizado en conducto auditivo externo izquierdo en una mujer de 55 años. El patrón histológico, bien diferenciado, contrasta con la marcada agresividad clínica del proceso, que hace prever un mal pronóstico a pesar del tratamiento instaurado.
- **Descripción clínica y evaluación hormonal de un varón 48, XXYY. Comparación con los casos previos publicados** 138
L. FORGA, J. J. BARBERIA, F. J. LAFITA, E. L. MENENDEZ, R. M. RODRIGUEZ
Se aporta un nuevo caso del infrecuente síndrome 48, XXYY con sus particularidades clínicas y analíticas, destacando los elevados valores de somatomedina C y de HGH no descritos anteriormente.
- **Regresión tumoral espontánea en un paciente con cáncer gástrico metastásico. Comunicación de un caso adicional** 141
J. REBOLLO, I. LLORENTE, A. YOLDI
Se presenta una regresión tumoral espontánea en una paciente con adenocarcinoma gástrico metastásico, asociado a un foco infeccioso, en este caso un absceso de pared abdominal relacionado con la cicatriz de laparotomía.
-

FORMACION CONTINUADA

- **Contraceptivos y cardiopatía isquémica** 144
I. GARCIA-BOLAO, E. ALEGRIA, I. IGLESIAS, S. VELASCO, P. ALZAMORA, M. L. FIDALGO
El consumo de la píldora anticonceptiva incrementa entre 2 y 4 veces la incidencia de infarto agudo de miocardio. Los estudios que tratan de determinar la razón de este incremento son muchos y con resultados contradictorios. Los mecanismos fisiopatológicos implicados pueden resumirse en dos grandes grupos: a) modificación de los factores de riesgo aterógeno y b) trastornos de la coagulación.
-

— Síndrome antifosfolípido y enfermedad cardiovascular 151

J. I. GARCIA-BOLAO, I. IGLESIAS, M. L. FIDALGO, E. ALEGRIA, S. MEJIA,
A. HUELMOS, C. GARROTE

El síndrome antifosfolípido presenta, entre otras manifestaciones, trombosis recurrentes, abortos de repetición y trombocitopenia, y se acompaña de anticuerpos contra algunos fosfolípidos aniónicos. Inicialmente fue incluido dentro del amplio grupo de síntomas y signos del lupus eritematoso sistémico, pero actualmente se considera como una entidad independiente de las demás enfermedades autoinmunes.

ACTUALIZACION EN CIRUGIA

— Malformaciones congénitas del atlas: clasificación y repercusión clínica 157

C. VILLAS, R. E. VIDES, R. YAÑEZ

Se propone una clasificación anatómica de las anomalías congénitas del atlas para facilitar el examen radiológico sistemático de la charnela occipito-cervical, de forma que puedan reconocerse con facilidad las anomalías descritas, evitando errores de diagnóstico tanto por fallo en reconocer que existe una anomalía como por dar importancia a alteraciones que no la tienen, tal como sucede al diagnosticar como fractura una lesión que es en realidad una malformación congénita o viceversa.

— Adenomas oxifílicos como causa de hiperparatiroidismo primario 163

J. A. BARRIOS, M. C. ROBLEDO, F. CONTRERAS, J. ALVAREZ-CIENFUEGOS, J. VOLTAS

Describimos tres casos clínicos de mujeres que desarrollaron sintomatología clínica de hiperparatiroidismo primario debido a tumor funcionante en glándula paratiroides. La osteoporosis, la hipertensión arterial y la nefrolitiasis fueron los antecedentes patológicos más comunes. Los niveles de PTH, calcio en sangre y orina se encontraban muy por encima de la normalidad. La ultrasonografía y la tomografía computarizada confirmaron la presencia de tumor en la glándula paratiroides.

SECCION ONCOLOGICA

— Marcadores tumorales del urotelio: estado actual 167

F. DE CASTRO, D. ROSELL, L. G. AGÜERA, W. ISA, P. SANCHEZ DE LA MUELA, J. E. ROBLES,
J. J. ZUDAIRE, J. M. BERIAN

Se revisa la evolución seguida en la búsqueda de marcadores tumorales de las neoplasias de origen urotelial. Aunque actualmente se han identificado algunas sustancias con utilidad como marcadores (especialmente antígenos de superficie), la complejidad técnica y difícil aplicación a gran escala han dificultado su uso rutinario. La utilización de nuevos anticuerpos monoclonales en la detección y seguimiento de las neoplasias uroteliales, inicia una nueva y prometedora etapa en la búsqueda de marcadores tumorales de mayor sensibilidad y especificidad.

— Quimioterapia complementaria del cáncer de mama; experiencia de la Clínica Universitaria de Navarra 172

J. M. VIEITEZ, S. MARTIN ALGARRA, L. MUÑOZ, O. FERNANDEZ HIDALGO, P. HERRANZ,
I. AZINOVICK, G. ZORNOZA

Desde 1982 a 1989 se han tratado 68 pacientes con carcinoma de mama. 57 han sido premenopáusicas y 11 postmenopáusicas. El estadio tumoral más frecuente ha sido T2N1 (44,1 %) seguido de T1N1 (20,6 %). La dosis media de quimioterapia recibida ha sido de 91,2 %, 88 % y 94 % para la ciclofosfamida, metotrexate y 5-fluorouracilo respectivamente.

MEDICINA Y PERSONA

— Vivir y morir con dignidad 176

REVISTA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

VOL. XXXIV - N.º 3 - July-September 1990

Contents

ORIGINAL ARTICLES

Bronchoalveolar lavage in patients operated of open heart surgery

C. Abad
131

CLINICAL REPORTS

Adenocarcinoma of ceruminous glands

E. Urbiola Marcilla
135

Clinical aspects and hormonal study in a 48, XXY male

L. Forga, J. J. Barbería, F. J. Lafita, E. L. Menéndez,
R. M. Rodríguez
138

Spontaneous tumor regression of a metastatic gastric carcinoma. Report of an additional case

J. Rebollo, I. Llorente, A. Yoldi
141

CONTINUING EDUCATION

Oral contraceptive use and ischemic heart disease

I. García-Bolao, E. Alegría, I. Iglesias, S. Velasco,
P. Alzamora, M. L. Fidalgo
144

Antiphospholipid syndrome and ischemic heart disease

J. I. García-Bolao, I. Iglesias, M. L. Fidalgo, E. Alegría,
S. Mejía, A. Huelmos, C. Garrote
151

SURGERY UPDATED

Congenital anomalies of atlas: classification and clinical relevance

C. Villas, R. E. Vides, R. Yáñez
157

Oxyphil adenomas causing primary hyperparathyroidism

J. A. Barrios, M. C. Robledo, F. Contreras,
J. Alvarez-Cienfuegos, J. Voltas
163

ONCOLOGY SECTION

Markers of urotelic tumours: A review

F. de Castro, D. Rosell, L. G. Agüera, W. Isa,
P. Sánchez de la Muela, J. E. Robles,
J. J. Zudaire, J. M. Berrián
167

Adjuvant chemotherapy in breast cancer; experience in the Clínica Universitaria de Navarra

J. M. Vieitez, S. Martín Algarra, L. Muñoz, O. Fernández Hidalgo,
P. Herranz, I. Azinovick, G. Zornoza
172

MEDICINE AND PERSON

Living and dying with dignity

176